



BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM

VẮC XIN PHÒNG COVID-19 PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA **ASTRAZENECA**

Đợt tiêm vắc xin phòng Covid - 19 đầu tiên tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 8/3/2021, sử dụng 117.600 liều vắc xin của Astrazeneca

PHẢN ỨNG RẤT PHỔ BIẾN ($\geq 10\%$)


 Đau đầu

 Buồn nôn

 Đau cơ

 Đau khớp

 Nhạy cảm đau

 Đau, nóng tại vị trí tiêm


 Ngứa

 Mệt mỏi

 Bồn chồn

 Sốt*, ớn lạnh


PHẢN ỨNG PHỔ BIẾN (từ 1% đến dưới 10%)

 Sưng và đỏ tại vị trí tiêm

PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG (có thể xảy ra)**

 Sốc phản vệ, phản ứng quá mẫn muộn

KHUYẾN CÁO

 Tiêm đủ **2 liều** của cùng một loại vắc xin phòng COVID-19

 **14 ngày**

Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu cách **14 ngày** với các vắc xin phòng bệnh khác

* Rất phổ biến là sốt nhẹ, phổ biến là sốt trên 38 độ C.

**Hiện nay Tổ chức y tế Thế giới (WHO) chưa có đầy đủ dữ liệu