





## PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

### TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH

TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH	
<b>Định nghĩa</b>	<p>Tắc lệ đạo là tình trạng tắc nghẽn sự lưu thông nước mắt trong hệ thống ống nối thông giữa mắt xuống mũi. Bệnh thường biểu hiện bằng triệu chứng chảy nước mắt, mắt đỏ ghèn liên tục từ sau sinh. Ấn vùng túi lệ ra dịch nhầy trong hay mù đục.</p> 
<b>Nguyên nhân</b>	<p>Tắc lệ đạo ở trẻ sơ sinh là một bệnh lý thường gặp và thường biểu hiện trong những ngày đầu sau sinh. Bất thường này do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra và có thể tự hồi phục sau một khoảng thời gian.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quá trình hình thành lệ đạo trong bào thai chưa hoàn chỉnh nên đầu dưới của ống lệ mũi còn màng tắc.</li><li>- Không có hoặc hẹp điểm lệ, hẹp lệ đạo.</li></ul>
<b>Chẩn đoán</b>	<p>Tắc lệ đạo bẩm sinh ở 1 hoặc cả 2 mắt.</p>
<b>Điều trị</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dưới 1 tuổi: Thường day ấn góc trong mắt, có thể thông lệ đạo sớm hơn đối với trường hợp nang nhầy túi lệ hoặc ấn góc trong ra nhiều mù nhầy.</li><li>- Trên 1 tuổi: thông lệ đạo (gây mê).</li><li>- Trẻ lớn, hoặc đã thông lệ đạo nhiều lần trước đó: thông lệ đạo + đặt ống silicon</li></ul>



**Khám đánh giá trước phẫu thuật**      Đánh giá mắt bệnh, tình trạng viêm, tiền căn thông lệ đạo ở tuyến dưới.

## PHẪU THUẬT

**Xét nghiệm**

- Xét nghiệm tiền phẫu.
- Xét nghiệm bổ sung nếu cần.

**Chuẩn bị hồ sơ trước phẫu thuật**

- Khám tiền mê
- Khai thác tiền căn bệnh lý
- Kiểm tra hồ sơ

**Phẫu thuật**

- Xác nhận lại thông tin người bệnh.
- Gây mê nội khí quản
- Thực hiện thủ thuật thông lệ đạo
- Bơm rửa lệ đạo kiểm tra sau thông
- Nếu cần có thể đặt ống silicon
- Tra thuốc mỡ kháng sinh.

**Thuốc**      - **Thuốc nhỏ:** Nước mắt nhân tạo, kháng sinh, kháng viêm

## ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI SAU PHẪU THUẬT

**Khám đánh giá bệnh và điều trị**      - Khám mắt sau mổ: đánh giá tình trạng chảy nước mắt, tình trạng ống silicon, tình trạng chảy dịch ở mũi

**Sinh hoạt**      - Bình thường

<b>Dinh dưỡng</b>	- Chế độ ăn sau khi phẫu thuật có gây mê hoặc gây tê
<b>Truyền thông cho người bệnh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông tin về các loại thuốc được dùng.</li> <li>- Cách chăm sóc mắt sau phẫu thuật: lưu ý không để bé dụi mắt, mũi nếu có đặt ống silicon</li> <li>- Sự hồi phục bình thường và dấu hiệu cần báo bác sĩ</li> <li>- Xem lại hướng dẫn khi ra viện; đơn thuốc về nhà;</li> <li>- Tái khám đúng hẹn.</li> </ul>
<b>Dặn dò khi ra viện</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng thuốc theo toa và tái khám đúng hẹn.</li> <li>- Theo dõi biến chứng: chảy máu, nhiễm trùng, ...</li> <li>- Cách chăm sóc mắt sau phẫu thuật : lưu ý không để bé dụi mắt, mũi nếu có đặt ống silicon.</li> <li>- Xác định lại kế hoạch ra viện với bạn/gia đình/cơ sở điều trị sắp đến.</li> <li>- Cấp đơn thuốc và giấy xuất viện, hẹn tái khám.</li> </ul>