



BỆNH VIỆN MẮT TP.HCM

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM LOÉT GIÁC MẶC

ĐỊNH NGHĨA

Viêm loét giác mạc là tình trạng viêm nhiễm của giác mạc (tròng đen) có liên quan nhiễm trùng (vi trùng, nấm, virus, ký sinh trùng,...) hoặc không liên quan nhiễm trùng (thiếu Vit A, bong, hở mi, bệnh lý toàn thân,...). Viêm loét giác mạc nhiễm trùng thường xảy ra sau một chấn thương cơ học.

TRIỆU CHỨNG

- Đỏ mắt, đau trung bình đến nhiều, chói sáng, sợ ánh sáng.
- Nhìn mờ, giảm thị lực, chày ghèn, chất tiết.
- Nếu do vi khuẩn *Pseudomonas*, bệnh khởi phát cấp tính trong 1-2 ngày.
- Nếu do *Herpes simplex* đã có tiền sử tái phát nhiều lần.

Triệu chứng thực thể:

- Thời gian ủ bệnh ngắn, với *Pseudomonas spp* trong vòng 24-48 giờ.
- Dấu chứng ngoài giác mạc: chất tiết nhầy mủ, phù mi trên, cương tụ kết mạc.
- Dấu chứng tại giác mạc: Đốm trắng khu trú trong nhu mô giác mạc kèm với khuyết biếu mô giác mạc và khuyết / mỏng nhu mô bên dưới. phù nhu mô, nhăn

PHẪU THUẬT

đọng tế bào... Tùy loại tác nhân gây loét mà đặc điểm tại

mắt đặc trưng khác nhau.

- Nguồn loét ngừng tiến triển nhưng lâu lành: chỉ định khâu phồng. Dính mồng sau, máu
- Dấu chứng nội nhãn: phản ứng tiến phồng, linit tiến phồng. Dính mồng sau, máu
- Ghép giác mạc có thể được chỉ định khi sẹo giác mạc yên và ảnh hưởng nhiều đến thị lực, tuy nhiên trước đó nên thử dùng kính áp tròng cứng thấm khí (RGP lens) và nước

Ngày 1:

- Kính áp tròng thay đổi độ sốt tiến phồng. Giảm, nuôi cấy, kháng sinh đồ.

Ngày 4: Có kết quả nuôi cấy, kháng sinh đồ.

XÉT NGHIỆM

-Lâm PCR nếu các xét nghiệm soi tươi và nuôi cấy âm tính.

-Lấy bệnh phẩm để loét soi tươi, nhuộm Gram, nuôi cấy, kháng sinh đồ.

Ngày 4:

-Có kết quả nuôi cấy, kháng sinh đồ.

-Đưa vào kết quả điều trị lâm sàng mà bác sĩ điều trị có thể yêu cầu làm xét nghiệm vi sinh lại.

-Lấy bệnh phẩm để loét soi tươi, nhuộm Gram, nuôi cấy, kháng sinh đồ.

Ngày 4:

-Thuốc nhỏ Atropin 1% dân đồng tử + liệt điều tiết.

-Có kết quả nuôi cấy, kháng sinh đồ.

-Đưa vào kết quả điều trị lâm sàng mà bác sĩ điều trị có thể yêu cầu làm xét nghiệm vi sinh lại.

-Giảm đau

Lâm PCR nếu các xét nghiệm soi tươi và nuôi cấy âm tính.

-Vitamin nâng tổng trạng.

H. 17/01/2018