



PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

PHẪU THUẬT QUẠM

PHẪU THUẬT QUẠM

Định nghĩa Quặm mi là tình trạng bờ mi bị cuộn vào trong nhãn cầu, khiến lông mi cọ xát với mắt gây mẩn đỏ, kích ứng và trầy xước giác mạc.

Chỉ định

- Triệu chứng chảy nước mắt, hay dụi mắt, hay nheo mắt, đỏ mắt.
- Quặm mi: lông mi cuộn vào trong, cọ xát vào kết mạc và giác mạc gây viêm kết mạc, tổn thương biểu mô giác mạc dẫn đến biến chứng sẹo giác mạc

Khám đánh giá bệnh trước phẫu thuật

- Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ.
- Đo thị lực, nhãn áp.
- Bác sĩ điều trị khám bệnh, chẩn đoán bệnh.
- BS trưởng phó khoa khám, phân loại bệnh, duyệt mổ.

Xét nghiệm & cận lâm sàng

- Xét nghiệm tiền phẫu.
- Siêu âm nhãn cầu - hóc mắt nếu cần

PHẪU THUẬT

Chuẩn bị hồ sơ trước phẫu thuật

- Khai thác tiền sử người bệnh, nhỏ tê hoặc gây tê tại chỗ
- Kiểm tra hồ sơ bệnh án.
- Xét nghiệm bổ sung nếu cần.
- Thân nhân người bệnh và người bệnh ký cam kết phẫu thuật
- Điều dưỡng thực hiện y lệnh thuốc điều trị

Phẫu thuật

- Xác nhận lại thông tin người bệnh.
- Chuyển người bệnh vào phòng mổ.
- Phẫu thuật quặm mi theo phác đồ điều trị
- Tra thuốc mỡ kháng sinh.

ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI SAU PHẪU THUẬT

Khám đánh giá sau phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ. - Đo thị lực, nhãn áp. - BS phẫu thuật khám tình trạng mắt sau mổ, đánh giá, kết mạc, giác mạc, tình trạng tiền phòng.
Thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thuốc nhỏ: Nước mắt nhân tạo, kháng sinh. - Thuốc tra: Kháng sinh. - Thuốc uống: Kháng sinh, kháng viêm toàn thân, giảm đau (1 ngày).
Sinh hoạt	<ul style="list-style-type: none"> - Đi lại bình thường
Dinh dưỡng	<ul style="list-style-type: none"> - Chế độ ăn dễ tiêu, đầy đủ chất dinh dưỡng, - Không hút thuốc, rượu bia. - Nên ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước để tránh táo bón.
Truyền thông & GDSK	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc mắt sau mổ, chườm đá nếu cần - Tư vấn cách sử dụng thuốc và tác dụng phụ của thuốc. - Sự hồi phục bình thường và dấu hiệu cần báo bác sĩ. - Xem lại hướng dẫn khi ra viện, đơn thuốc về nhà. - Dùng thuốc theo toa và tái khám đúng hẹn. - Theo dõi biến chứng: chảy máu, nhiễm trùng, ... - Xác định lại kế hoạch ra viện với bạn / gia đình / cơ sở điều trị sắp đến. - Cấp đơn thuốc và giấy xuất viện, hẹn tái khám mỗi sáu tháng - Cắt chỉ da mi sau 1 tuần.