



PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

QUẶM MI BẨM SINH

ĐỊNH NGHĨA

Quặc mi dưới bẩm sinh chủ yếu do sự thừa nếp mô bao gồm cơ vòng mi và da dẫn đến lông mi bị cuộn vào trong gây cọ xát bề mặt nhãn cầu.

TRIỆU CHỨNG

Triệu chứng cơ năng

- Chảy nước mắt, hay dụi mắt, hay nheo mắt, đỏ mắt.

Triệu chứng thực thể

- Quặc mi trên / dưới: lông mi cuộn vào trong, cọ xát vào giác mạc.
- Viêm kết mạc

Tổn thương biểu mô giác mạc

- Biến chứng: sẹo giác mạc.

XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm đường huyết.

Xét nghiệm bổ sung nếu cần.

Siêu âm nhãn cầu - hốc mắt nếu cần.

PHẪU THUẬT

Điều trị ngoại trú nếu trẻ dưới 3 tuổi: điều trị triệu chứng, kéo bật mi dưới.

Chi định phẫu thuật nếu:

Trẻ dưới 3 tuổi nhưng có biến chứng: cân nhắc chi định phẫu thuật

Trên 3 tuổi kèm triệu chứng giác mạc: phẫu thuật quặt.

THUỐC

Kháng sinh tại chỗ:

- Kháng sinh toàn thân:
- Giảm đau :
- Kháng viêm toàn thân:

CHĂM SÓC SAU PHẪU THUẬT

Chườm đá sau mổ nếu cần.

Khám mắt sau mổ: đánh giá thị lực, tình trạng vết mổ, tình trạng mi dưới sau mổ.

Dùng thuốc theo toa và tái khám đúng hẹn.

Theo dõi biến chứng: chảy máu, nhiễm trùng, ...

Cắt chỉ da sau 1 tuần

Theo dõi mỗi 6 tháng quặm tái phát.