



PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH

ĐỊNH NGHĨA

Tắc lệ đạo là tình trạng tắc nghẽn sự lưu thông nước mắt trong hệ thống ống nối thông giữa mắt xuống mũi. Bệnh thường biểu hiện bằng triệu chứng chảy nước mắt, mắt đỏ ghèn liên tục từ sau sinh. Ấn vùng túi lệ ra dịch nhầy trong hay mù đục.

TRIỆU CHỨNG

- Có thể xảy ra ở cả hai mắt hoặc một mắt
- Trẻ chảy nước mắt tự nhiên, mắt luôn ướt từ sau sinh vài tuần tuổi
- Ghèn mù đọng quanh góc trong mắt, đôi khi đọng và khgo lại quanh mi dưới
- Viêm kết mạc kéo dài
- Ấn góc trong thường ra dịch trong hoặc mù nhầy.

PHẪU THUẬT

- Xác nhận lại thông tin người bệnh.
- Gây mê nội khí quản
- Thực hiện thủ thuật thông lệ đạo
- Bơm rửa lệ đạo kiểm tra sau thông
- Nếu cần có thể đặt ống silicon
- Tra thuốc mỡ kháng sinh..

XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm đường huyết.
Xét nghiệm bổ sung nếu cần.
Siêu âm nhãn cầu - hóc mắt nếu cần.

THUỐC

- Kháng sinh kháng viêm tại chỗ
- Kháng sinh toàn thân
- Giảm đau ngay đầu sau mổ

CHĂM SÓC SAU PHẪU THUẬT

- Chế độ ăn sau khi phẫu thuật có gây mê hoặc gây tê
- Thông tin về các loại thuốc được dùng.
- Cách chăm sóc mắt sau phẫu thuật: lưu ý không để bé dụi mắt, móc mũi nếu có đặt ống silicon
- Theo dõi biến chứng: chảy máu, nhiễm trùng
- - Tái khám định kỳ sau 1 tuần, 1 tháng , 3 tháng và 6 tháng

