



THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC

Neocin

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC ĐƯỢC SĨ
NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
GẤP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC**

- Thành phần công thức thuốc**
 - Thành phần hoạt chất:
 - Neomycin sulfat 25 mg (#17000IU)
 - Thành phần tá dược: Natri citrat, propylen glycol, natri clorid, phenyl mercuric nitrat, nước cất vừa đủ 1 lọ 5 ml.
- Dạng bào chế**
 - Dung dịch nhỏ mắt.
 - Dung dịch trong, không màu hay hơi vàng, vị hơi mặn.
- Chỉ định**
 - Các bệnh nhiễm trùng ở mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin như: viêm kết mạc, giác mạc, viêm mí mắt, viêm túi lệ.
 - Các bệnh nhiễm trùng mắt trước hoặc sau khi phẫu thuật mắt và sau chấn thương.
- Cách dùng và Liều dùng**
 - Nhiễm trùng nặng: Nhỏ 2 - 4 giọt mỗi giờ.
 - Liều thông thường: Nhỏ 2 giọt/lần, ngày 3 - 4 lần.
- Chống chỉ định**
 - Người bị dị ứng với Neomycin.
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**
 - Không nên dùng lâu dài vì thuốc có thể gây dị ứng da.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú**
 - Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.
- Tương tác của thuốc**
 - Có thể xảy ra dị ứng chéo với các aminoglycosid khác.
- Tương kỵ của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC

Neocin

thuốc khác.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc**
 - Thuốc có thể gây dị ứng như viêm da, ngứa, rất hiếm gây sốt hay sốc phản vệ.
- Quá liều và cách xử trí**
 - Quá liều:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
 - Cách xử trí:** Tịch cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
- Đặc tính dược lý học**
 - Nhóm dược lý: Kháng sinh nhóm aminoglycosid.
 - Mã ATC: S01AA03.
 - Neomycin là một kháng sinh diệt khuẩn thuộc nhóm aminosid, có hoạt tính trên phần lớn những chủng gây bệnh liên quan đến nhiễm trùng mắt.
 - Phổ kháng khuẩn của Neomycin bao gồm Staphylococcus, Gonococcus, Acinetobacter, Brucella, Escherichia coli, Haemophilus, Klebsiella, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia.
- Đặc tính dược động học**
 - Neomycin hấp thu kém qua đường tiêu hoá. Sau khi dùng tại chỗ, lượng thuốc hấp thu không đủ để tạo ra tác dụng toàn thân. Sau khi hấp thu, neomycin nhanh chóng thải ra thận ở dạng hoạt tính.
- Quy cách đóng gói:** Hộp 1 lọ 5ml.
- Điều kiện bảo quản**
 - Ở nhiệt độ không quá 30°C.
 - Đậy nắp kín ngay sau khi dùng.
- Hạn dùng**
 - 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
 - Chỉ sử dụng trong 15 ngày sau khi mở nắp lọ.
- Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:** TCCS
- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
367 Nguyễn Trãi, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam.
Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO
1/67 Nguyễn Văn Quá, Q. 12, TP. HCM, VN.

