

Thuốc nhỏ mắt, mũi  
**Natri clorid**  
0,9%

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

TÀI LIỆU  
CÓ KIỂM SOÁT

28/02/2018

1. Mẫu nhãn trên hộp



Thành phần:  
Natri clorid.....72mg  
Tá dược vđ.....8 ml

Chỉ định:  
- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt phòng và điều trị các triệu chứng về mắt như: Mỏi mắt, ngứa đỏ mắt, khô rát mắt, bụi bẩn, ghen dờ mắt.  
- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.  
- Trị các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi.

Dùng được cho trẻ sơ sinh  
Cách dùng - liều dùng:  
- Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi mắt. Ngày dùng 4 - 6 lần.  
- Nhỏ 3 - 5 giọt vào mỗi mũi. Ngày dùng 4 - 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Không có. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG**  
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.  
ĐT: (0320) 3853649 - 3859824

SĐK:

18001107  
Bên mua từ mắt mũi tại  
Web: www.haiaonline.com

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc.  
Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.  
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.  
Tương tác thuốc: Không có.  
Quá liều và xử trí: Chưa thấy có báo cáo quá liều.

2. Mẫu nhãn trên lọ



Chỉ định:  
- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt phòng và điều trị các triệu chứng về mắt như: Mỏi mắt, ngứa đỏ mắt, khô rát mắt, bụi bẩn, ghen dờ mắt.  
- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.  
- Trị các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi. Dùng được cho trẻ sơ sinh.  
Cách dùng - liều dùng: - Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi mắt. Ngày dùng 4 - 6 lần.  
Nhỏ 3 - 5 giọt vào mỗi mũi. Ngày dùng 4 - 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần.  
Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.  
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng nhiệt độ không quá 30°C.  
ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.  
Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:  
Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:



Thuốc nhỏ mắt, mũi  
**Natri clorid**  
**0,9%**

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

TÀI LIỆU  
CÓ KIỂM SOÁT

28/02/2018

1. Mẫu nhãn trên hộp

**HDPHARMA**  
SINCE 1971

Thuốc nhỏ mắt, mũi

**Natri clorid**  
**0,9%**

10ml

**GMP WHO**

Thành phần:  
Natri clorid.....90mg  
Tá dược vơ.....10 ml

Chỉ định:  
- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt phòng và điều trị các triệu chứng về mắt như: Mỏi mắt, ngứa đỏ mắt, khô rát mắt, bụi bẩn, ghen dờ mắt.  
- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.  
- Trị các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi.

Dùng được cho trẻ sơ sinh  
Cách dùng - liều dùng:  
- Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi mắt. Ngày dùng 4 - 6 lần.  
- Nhỏ 3 - 5 giọt vào mỗi mũi. Ngày dùng 4 - 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần.

Chống chỉ định:  
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Không có  
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày

**HDPHARMA**  
SINCE 1971

Thuốc nhỏ mắt, mũi

**Natri clorid**  
**0,9%**

10ml

**GMP WHO**


ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG**  
102 Chi Lăng - P. Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.  
ĐT: (0320) 3853948 - 3853924

SDK:

18001107  
Điện thoại tư vấn miễn phí  
Web: www.haiphuongoc.com

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc.  
Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.  
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.  
Tương tác thuốc: Không có.  
Quá liều: Không thấy có báo cáo.



2. Mẫu nhãn trên lọ

**HDPHARMA**  
SINCE 1971

10ml thuốc nhỏ mắt, mũi

**Natri clorid 0,9%**

Thành phần: Natri clorid.....90mg  
Tá dược vơ.....10 ml

**C.TY CP DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG**

Chỉ định:  
- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt phòng và điều trị các triệu chứng về mắt như: Mỏi mắt, ngứa đỏ mắt, khô rát mắt, bụi bẩn, ghen dờ mắt.  
- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.  
- Trị các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi. Dùng được cho trẻ sơ sinh  
Cách dùng - liều dùng: - Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi mắt. Ngày dùng 4 - 6 lần.  
Nhỏ 3 - 5 giọt vào mỗi mũi. Ngày dùng 4 - 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

385-  
GTY  
EMHUU  
ANH V  
UOC  
I GÒ  
P HỒ

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc nhỏ mắt NATRI CLORID 0,9%

TÀI LIỆU  
CÓ KIỂM SOÁT

28/02/18

**Dạng bào chế:** Dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi

**Công thức:** (cho 8 ml):

Natri clorid

72 mg

Nipagin, nipasol, nước cất pha tiêm

Vừa đủ 8 ml

**Quy cách:** Hộp 1 lọ x 8 ml, Hộp 1 lọ 10ml.

### Chỉ định:

- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt phòng và điều trị các triệu chứng về mắt như: Mỏi mắt, ngứa đỏ mắt, khô rất mắt, bụi bẩn, ghen dừ mắt.
- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.
- Trị các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi.

Dùng được cho trẻ sơ sinh

### Liều dùng – cách dùng:

- Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi mắt . Ngày dùng 4 đến 6 lần.
- Nhỏ 3 - 5 giọt vào mỗi mũi . Ngày dùng 4 đến 6 lần.

Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần.

### Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

**Thận trọng:** Không có

### Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

### Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc dùng được khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc.

**Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

### Tương tác thuốc

Không có

**Quá liều và xử trí :** Chưa thấy có báo cáo về sử dụng quá liều.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì*

*Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày.*

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

TÀI  
CÓ KIỂM



Tiêu chuẩn: TCCS

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Để xa tầm tay của trẻ em.*

*Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ*

Nhà sản xuất

**CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương-Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203.853.848

LIỆU  
M SOÁT



005  
CỔ  
TÁCH  
ỚT T  
SÀ  
T. T.

## TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: NATRI CLORID 0,9%

2. Mô tả sản phẩm:

Thuốc nhỏ mắt, mũi dạng dung dịch trong, không màu.

3. Thành phần của thuốc ( cho 8 ml):

Natri clorid

72 mg

Nipagin, nipasol, nước cất pha tiêm

Vừa đủ 8 ml

4. Hàm lượng của thuốc : Natri clorid 0,9%

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt phòng và điều trị các triệu chứng về mắt như: Mỏi mắt, ngứa đỏ mắt, khô rát mắt, bụi bẩn, gèn dử mắt.

- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.

- Trị các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi.

Dùng được cho trẻ sơ sinh

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

- Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi mắt . Ngày dùng 4 đến 6 lần.

- Nhỏ 3 - 5 giọt vào mỗi mũi .Ngày dùng 4 đến 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

8. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo

*Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

9. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Không có lưu ý đặc biệt

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên thuốc một lần.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Chưa thấy có báo cáo về sử dụng quá liều

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Tham vấn nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

TÀI LIỆU  
CÓ KIỂM SOÁT

28/02/19

TÀI  
CÓ KIẾ



23  
-NC  
-HIE  
-TAT  
-UC  
-G  
-H

14. Tên, biểu tượng của nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Không có

16. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng thuốc khác, hoặc khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: Ngay khi có phản hồi của người sử dụng về tác dụng không mong muốn của thuốc.

LIỆU  
M SOÁT



385  
: TY  
PHU  
H VI  
C  
ON  
CH