



# Vắc xin sởi: Tiêm bổ sung cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi là an toàn và cần thiết

Vì sao trong tình huống hiện nay phải tổ chức tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi?

Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi là đối tượng **nguy cơ dễ mắc bệnh** khi có dịch sởi. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ mắc sởi sẽ có **nhiều biến chứng nguy hiểm**.

Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi giúp **bảo vệ trẻ không mắc bệnh và hạn chế tử vong**.



Việc tiêm vắc xin sởi đơn cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi có an toàn không?

Một số quốc gia trên thế giới đã tiêm vắc xin sởi đơn cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi khi có dịch sởi xảy ra, thậm chí đưa vào lịch tiêm chủng định kỳ.

Nghiên cứu tại Việt Nam cũng cho thấy độ an toàn và hiệu quả khi tiêm vắc xin sởi đơn cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.

Đến khi đủ 9 tháng tuổi thì trẻ có thực hiện tiêm vắc xin sởi theo lịch Tiêm chủng mở rộng không?

Mũi tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được gọi là mũi "**tiêm bổ sung**" hay mũi "**Sởi 0**". Do vậy, vẫn phải tiếp tục tiêm cho những trẻ này theo lịch Tiêm chủng mở rộng như sau:

- + Mũi **Sởi 1**: Tiêm khi trẻ **đủ 9 tháng tuổi**.
- + Mũi **Sởi 2**: Tiêm khi trẻ **đủ 18 tháng tuổi**.

