

206183



BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/10/12



*Handwritten signature*

BLUEYE Eye Drops

Artificial Tears for Dry and Sensitive eye

BLUEYE 15ml/10/12

Artificial Tears for Dry and Sensitive eye

- **Composition :**  
Each mL contains  
Hypromellose ..... 3mg  
Dextran70 ..... 1mg
- **Indication / Dosage & Administration / Adverse reactions & Precautions :**  
Please see insert paper
- **Storage :** Store in tightly closed container at temperature not exceeding 30 °C
- **Shelf life :** 2 years from manufacturing date
- **Package :**  
15ml/bottle, 1bottle/box


[For more details information, refer to the insert paper.]

Keep out of reach of children  
Read insert paper carefully before use.

Manufactured By  
**SAMCHUNDANG PHARM.CO.,LTD**  
904-1, Sangshin-Ri, Hyangnam-Myun,  
Hwaseong-City, Gyeonggi-Do, Korea

BLUEYE  
Eye Drop

15mL



- **Thành phần: Mỗi ml chứa:**  
Hypromellose ..... 3mg  
Dextran70 ..... 1mg
- **Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:**  
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
- **Bảo quản:** Trong hộp kín, ở nhiệt độ không quá 30 °C
- **Dạng bào chế:** Dung dịch nhỏ mắt
- **Đóng gói:** 15ml/lo, 1 lo/hộp


ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK :  
Số lô SX :  
NSX :  
HD :  
DNNK :

Sản xuất tại:  
**SAMCHUNDANG PHARM.CO.,LTD**  
904-1, Sangshin-Ri, Hyangnam-Myun,  
Hwaseong-City, Gyeonggi-Do, Hàn Quốc

BLUEYE  
Eye Drop

15mL



BLUEYE Eye Drop  
Artificial Tears for Dry and Sensitive eye  
15mL

Manufactured By  
**SAMCHUNDANG PHARM, Korea**

- **Composition / Thành phần:**  
Each mL contains / Mỗi ml chứa:  
Hypromellose ..... 3mg  
Dextran70 ..... 1mg
- **Indications / Dosage & Administration / Adverse reactions & Precautions:**  
Please see insert paper
- Số lô SX :  
HD :



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

## Thuốc nhỏ mắt BLUEYE

■ **THÀNH PHẦN:** Mỗi ml chứa:

Hypromellose..... 3 mg

Dextran 70..... 1 mg

Tá dược: Benzalkonium clorid, Natri clorid, Kali clorid, Natri borat, Natri hydroxyd, Acid hydrocloric, Nước tinh khiết vô trùng.

■ **MÔ TẢ:**

Dung dịch trong suốt không màu.

■ **DƯỢC LÝ:**

**DƯỢC LỰC HỌC:**

Hypromellose và Dextran 70 kéo dài độ dính, tăng làm ẩm kết mạc và giác mạc, giúp mắt chuyển động dễ dàng hơn.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Hypromellose và Dextran 70 không thấm giác mạc, không vào hệ tuần hoàn qua mạch máu ở mắt.

■ **CHỈ ĐỊNH:**

Là nước mắt nhân tạo, dùng điều trị các triệu chứng khô mắt do thiếu mucin và thiếu nước mắt.

■ **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Chỉ dùng nhỏ mắt.

Nhỏ 1-2 giọt để giảm các triệu chứng kích ứng mắt, số lần nhỏ tùy theo triệu chứng.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Không dùng thuốc cho các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

■ **THẬN TRỌNG CHUNG:**

Nếu bị đau mắt, thay đổi thị trường, kích ứng, xung huyết hoặc khô cứng giác mạc kéo dài hơn 72 giờ thì nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Nếu bệnh nhân sử dụng kính sát tròng, nên bỏ kính ra trước khi nhỏ thuốc. Đeo kính trở lại sau khi đã nhỏ thuốc 30 phút.

Không dùng quá 30 ngày sau khi mở lọ.

Thận trọng khi dùng:

Để tránh nhiễm khuẩn, không để đầu nhỏ giọt của lọ thuốc chạm vào mắt. Không nên dùng khi thấy dung dịch thuốc bị vẩn đục.

Không nên dùng chung lọ thuốc với người khác để tránh nhiễm khuẩn.

■ **TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Không có.

■ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Sản phẩm này dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

■ **TÁC DỤNG PHỤ:**

Có thể xảy ra tình trạng thị lực giảm kèm theo gỉ mắt, chảy nước mắt hoặc mắt bị xung huyết, hoặc có thể xảy ra tình trạng quá mẫn.

\* **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc .**

■ **TÁC DỤNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Khi mới dùng, thuốc có thể gây mờ mắt trong thời gian ngắn. Nếu bị như vậy, chờ đến khi nhìn thấy rõ rồi mới lái xe hoặc vận hành máy móc.

■ **QUÁ LIỀU VÀ ĐIỀU TRỊ:**

Không có



1021  
ÔNG  
PH  
C PH  
M PH



■ **BẢO QUẢN**

**Trước khi mở nắp:** Bảo quản trong hộp kín ở nhiệt độ không quá 30°C.

**Sau khi mở nắp:** Không dùng quá 30 ngày.

**Để thuốc xa tầm tay trẻ em.**


■ **ĐÓNG GÓI:** 1 lọ / hộp

■ **HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất:

**SAMCHUNDANG PHARM. CO., LTD.**

904-1, Sangshin-Ri, Hyangnam-Myun, Hwaseong-City, Gyeonggi-Do, Hàn Quốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*

*all*

