


100%





cl.

200%



Handwritten signature or mark.




100%



Cl.

200%






100%




Handwritten signature or initials

200%



Handwritten signature or initials



Moxieye

Thành phần:
 Mỗi ống (1 ml) chứa: Mỗi ống (1ml) chứa: Moxifloxacin hydrochlorid tương đương với: Moxifloxacin.....5mg

Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, hàm lượng và cách dùng: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Composition:
 Each plastic ampoule (1 ml) contains:
 Moxifloxacin hydrochloride e.q to Moxifloxacin.....5mg

Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.

Storage: In the cold dry place, protect from light, below 30°C

Other information please see in the leaflet inside.
Quality specification: Manufacturer's standard

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

SD/C
 Số lô SX:
 NSX: dd/mm/yy
 HD: dd/mm/yy

Moxieye

Ric Thuốc kê đơn Hộp 5 ống 1 ml

Moxieye

Dung dịch nhỏ mắt
 Moxifloxacin hydrochlorid tương đương Moxifloxacin 5 mg/1 ml


1 ml

Shoabin Việt

SHOABIN


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG Y DƯỢC
 Công ty Cổ phần Phát triển và Hoạt động Y Dược

Handwritten mark.



Rx: Thuốc hồ tiêu

1 gói 1 ml



Dung dịch nhỏ mắt
Moxifloxacin hydrochloride
5 mg/1 ml

1 ml

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
HÀNG TRUNG
VIỆT NAM

Thành phần:
Mỗi gói (1 ml) chứa: Moxifloxacin hydrochloride trong dạng
vỏ Moxifloxacin
chất định, chống chỉ định, hiệu trọng, liều lượng và
cách dùng: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ
dưới 30°C.

Các bằng in khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Composition:
Each plastic ampoule (1 ml) contains:
Moxifloxacin hydrochloride eq to Moxifloxacin
indications, contraindications, precautions, dosage and
administration: Please see in the leaflet inside.
Storage: In the cold dry place, protect from light, below 30°C

Other information: Manufacturer's standard
Quality specification: Manufacturer's standard
Lưu ý hướng dẫn dùng trước khi dùng
Đã được trình xin cấp bằng cấp

SPTG
Số lô SX
NSX: 01/01/2011
Hb: 01/01/2011


Dung dịch nhỏ mắt
Moxifloxacin hydrochloride trong
dạng Moxifloxacin 5 mg/1 ml



Số lô SX: Hiện đang được cập nhật trực tiếp ở chân ống dưới dạng:
LSX: mmmyy
HD: dd.mm.yy

Handwritten signature or initials

Form for product packaging with multiple panels containing text in Vietnamese and English, and a circular official stamp at the top.




Thành phần:
Mỗi ống (1 ml) chứa: Moxidectin hydrochloride tương đương với Moxidectin...5mg
Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, lưu ý và cách dùng:
Xia nang trong 15 ngày đầu sử dụng.

Thành phần:
Each plastic ampoule (1 ml) contains: Moxidectin hydrochloride eq to Moxidectin...5mg
Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Flies are in the larval stage.
Storage: In the cold dry place, protect from light, below 28°C
Other information please see in the leaflet inside
Quality assurance: Manufacturer's standard

SDIC
Số ống: 1 ml
NSX: Ednammy
HCT: Ednammy

Thuốc không đơn
Hộp 20 ống 1 ml
Dạng giọt nhỏ mắt
Moxidectin hydrochloride trong dạng Moxidectin 5 mg/1 ml




Thuốc không đơn
Hộp 20 ống 1 ml
Dạng giọt nhỏ mắt
Moxidectin hydrochloride trong dạng Moxidectin 5 mg/1 ml

Manufacture:
Công ty TNHH Dược Phẩm Ednammy
Số 29/2 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM


Moxidectin
Chỉ định: Dùng để điều trị ký sinh trùng nội tạng và ngoài da ở gia súc (cows, sheep, goats, pigs) và gia cầm (chickens, ducks, turkeys, geese).
Chống chỉ định: Không dùng cho động vật đã mắc bệnh mắt.
Thận trọng: Không dùng cho động vật đang mang thai, cho con bú hoặc đang bị bệnh mắt.

Biện pháp: Rửa rửa vào khoảng 1 giờ trước khi dùng.
Quy cách: 20 ống 1 ml/ô.
Cần dùng: 1 ml hoặc 20 ống 0,5 ml/ngày đầu sử dụng.
Yêu cầu chất lượng: TCCS
Độc lý tương đối: dùng trước khi dùng 10 ngày trước khi tiêm vắc xin.

Thuốc không đơn
Hộp 20 ống 1 ml
Dạng giọt nhỏ mắt
Moxidectin hydrochloride trong dạng Moxidectin 5 mg/1 ml



Thuốc không đơn
Hộp 20 ống 1 ml
Dạng giọt nhỏ mắt
Moxidectin hydrochloride trong dạng Moxidectin 5 mg/1 ml



Handwritten mark resembling the number '1'.



Được đặt vào mắt
Phải rửa sạch kỹ trước khi dùng
Chống nước rửa mắt

Hộp 20 ống 2 ml

Hộp 20 ống 2 ml

Moxigone

Được đặt vào mắt
Phải rửa sạch kỹ trước khi dùng
Chống nước rửa mắt

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH HÒI
Số 10, Công trường Hà Nội Phố, Thành Phố, Hà Nội

Moxigone

Được đặt vào mắt
Phải rửa sạch kỹ trước khi dùng
Chống nước rửa mắt

Other Information:
This medicine should be used as directed.
Keep out of the reach of children.
Do not use if the seal is broken or the container is damaged.
Keep in a cool, dry place.
Store at room temperature (15°C to 25°C).
Do not use if the expiration date has passed.
Keep the container tightly closed.
Do not use if the solution is cloudy or contains particles.
Do not use if the solution has a strong odor.
Do not use if the solution is discolored.

STYLO
SUNSONG
MSK (HANOI)
HÀ NỘI

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



Đang chờ ảnh ảnh
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Moxieye

Hộp 09 dung 0,4 ml

Hộp 09 dung 0,4 ml

Moxieye
Dạng giọt nhỏ mắt
Hạt nhân kết tủa
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Hạt nhân kết tủa

Hộp 09 dung 0,4 ml

Moxieye
Dạng giọt nhỏ mắt
Hạt nhân kết tủa
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Hạt nhân kết tủa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG HÀ NỘI
Số 10 Đường Nguyễn Văn Bình, Phường, Thành Trì, Hà Nội

0,4 ml

Moxieye



Đang chờ ảnh ảnh
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Hạt nhân kết tủa
Dạng giọt nhỏ mắt
Hạt nhân kết tủa
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Hạt nhân kết tủa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG HÀ NỘI
Số 10 Đường Nguyễn Văn Bình, Phường, Thành Trì, Hà Nội

0,4 ml

Hạt nhân kết tủa
Dạng giọt nhỏ mắt
Hạt nhân kết tủa
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Đang chờ ảnh ảnh
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG HÀ NỘI
Số 10 Đường Nguyễn Văn Bình, Phường, Thành Trì, Hà Nội

0,4 ml

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



 Công ty TNHH

Moxieye

 Dung dịch nhỏ mắt

 Moxifloxacin hydrochloride tương đương Moxifloxacin 2 mg/0.4 ml

Quy cách: Hộp 20 ống 0.4 ml



Moxieye

Dung dịch nhỏ mắt

 Moxifloxacin hydrochloride tương đương Moxifloxacin 2 mg/0.4 ml



 Nhà sản xuất:


COC PHU

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

 SỐ 04-SXC

 0.4 ml

Moxieye

 Chất lượng tốt nhất, hiệu quả cao nhất, an toàn tuyệt đối.

 Không cần rửa mắt trước khi dùng.





Moxieye

 Bảo quản : Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

 Quy cách : 20 ống 0.4 ml/hộp

 Các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

 Tiêu chuẩn chất lượng: FCCS

 Độc lập hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 Để xa tầm tay trẻ em

Quy cách: Hộp 20 ống 0.4 ml



Moxieye

Dung dịch nhỏ mắt

 Moxifloxacin hydrochloride tương đương Moxifloxacin 2 mg/0.4 ml



 Nhà sản xuất:


COC PHU

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

 SỐ 04-SXC

 0.4 ml

Moxieye

 Thành phần :

 Mỗi ống 0.4ml chứa Moxifloxacin hydrochloride tương đương với Moxifloxacin.....2mg

 Chất ổn định, chống chỉ định, chất trong, không màu và cách dùng : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

 Composition:

 Each plastic ampoule (0.4 ml) contains:

 Moxifloxacin hydrochloride 0.4 mg

 Moxifloxacin.....2mg

 Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.

 Storage: in the cold dry place, protect from light, below 30°C

 Other information please see in the leaflet inside

 Quality specification: Manufacturer's standard

 SD/IC:

 SỐ 04-SXC

 NSX: ud/annaly


 HD: od/annaly

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Dic: Thuốc kê đơn

Hộp 10 ống 0,4 ml



Moxieye

Dung dịch nhỏ mắt
Moxifloxacin hydrochloride trong
dạng Moxifloxacin 2 mg/0,4 ml

Trên đây là:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC PHN
Số 113 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

0,4 ml

Moxieye

Dung dịch nhỏ mắt
Moxifloxacin hydrochloride trong
dạng Moxifloxacin 2 mg/0,4 ml

Thành phần:
Mỗi ống 0,4 ml chứa Moxifloxacin hydrochloride tương đương
với: Moxifloxacin.....2mg

**Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, liều lượng và
cách dùng:** Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Đào quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ
dưới 30°C.

Các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn chất lượng: TCOS
Composition:
Each plastic ampoule (0.4 ml) contains:
Moxifloxacin hydrochloride e.q to Moxifloxacin.....2mg

**Indications, contraindications, precautions, dosage and
administration:** Please see in the leaflet inside.
Storage: In the cold dry place, protect from light, below 30°C
Other information please see in the leaflet inside
Quality specification: Manufacturer's standard

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SĐK:
Số lô SX:
NSX: dphnphyy
HD: dphnphyy


Handwritten initials



Moxieye

Dung dịch nhỏ mắt
Moxifloxacin hydrochloride trong
dạng Moxifloxacin 2 mg/0,4 ml

Handwritten text at the bottom right



Rx: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



MOXIEYE

(Moxifloxacin 0,5%)

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần

Mỗi 1 ml có chứa :

Thành phần hoạt chất:

Moxifloxacin (Dưới dạng moxifloxacin hydroclorid).....5,0 mg

Thành phần tá dược: Acid boric, borax, natri clorid, acid hydrochloric, natri hydroxyd, nước tinh khiết vừa đủ 1 ml.

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt

Mô tả: Dung dịch trong, màu vàng nhạt

pH: 6,5 - 7,0

Chỉ định

Dung dịch nhỏ mắt Moxieye được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn ở mắt do các chủng vi sinh vật nhạy cảm; điều trị viêm loét giác mạc ; phòng ngừa tình trạng viêm và nhiễm khuẩn có thể xảy ra sau khi phẫu thuật mắt

Liều dùng và cách dùng

- Dung dịch nhỏ mắt Moxieye chỉ dùng để nhỏ mắt.
- Sử dụng ở người lớn, kể cả người cao tuổi: nhỏ 1 giọt vào mắt bị viêm 3 lần/ngày, dùng thuốc trong 7 ngày.
- Tình trạng viêm thường được cải thiện sau 5 ngày, cần tiếp tục điều trị trong 2 -3 ngày nữa. Nếu tình trạng viêm không được cải thiện sau 5 ngày điều trị, nên hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sử dụng ở trẻ em: không cần hiệu chỉnh liều. An toàn và hiệu quả của dung dịch nhỏ mắt có moxifloxacin ở trẻ em dưới 1 tuổi chưa được xác định.
- Sử dụng ở người suy gan thận: không cần hiệu chỉnh liều

Lưu ý: để tránh tạt nhiễm vào đầu lọ nhỏ thuốc, không được để đầu nhỏ thuốc tiếp xúc với mí mắt, vùng xung quanh mắt hoặc bất cứ vật nào. Đóng chặt lọ thuốc sau khi dùng.

Tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng, số lần dùng và thời gian dùng thuốc. Không tự ý ngừng sử dụng thuốc mà không tham vấn ý kiến bác sĩ. Không sử dụng thuốc đã quá hạn. Quan sát dung dịch thuốc nhỏ mắt cẩn thận trước khi dùng.

Chống chỉ định

Bạn không được sử dụng dung dịch nhỏ mắt Moxieye nếu bạn bị dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc, có tiền sử quá mẫn với moxifloxacin, các quinolon khác.

Không được dùng dung dịch nhỏ mắt Moxieye theo đường tiêm.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Như với các thuốc chống nhiễm khuẩn khác, dùng thuốc kéo dài có thể dẫn đến sự phát triển quá mức các chủng vi sinh vật không nhạy cảm, bao gồm cả bội nhiễm nấm. Nếu bội nhiễm xảy ra cần tới gặp bác sĩ và áp dụng những biện pháp điều trị thích hợp. Nếu bạn bị dị ứng



Vertical text on the right margin.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

với các kháng sinh khác tương tự như moxifloxacin, bạn có thể dị ứng khi dùng dung dịch nhỏ mắt Moxieye. Trong các trường hợp này, cần ngưng sử dụng thuốc, tới gặp bác sĩ để có các biện pháp điều trị thích hợp.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Thời kỳ mang thai

Vì không có các nghiên cứu có kiểm soát và đầy đủ ở phụ nữ mang thai, dung dịch nhỏ mắt moxifloxacin chỉ nên dùng trong thời kỳ mang thai khi lợi ích sử dụng cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho bào thai.

Thời kỳ cho con bú

Moxifloxacin không được xác định trong sữa mẹ, mặc dù moxifloxacin được cho là bài tiết qua sữa mẹ. Nên thận trọng khi sử dụng dung dịch Moxieye trong thời kỳ cho con bú

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Cũng giống như khi nhỏ mắt bất cứ thuốc nào khác, nhìn mờ tạm thời và các rối loạn thị giác có thể làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe và điều khiển máy móc của bạn. Nếu bị nhìn mờ sau khi nhỏ thuốc, bạn phải chờ đến khi nhìn rõ lại mới được lái xe và điều khiển máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc của dung dịch nhỏ mắt chứa moxifloxacin. Các nghiên cứu *invitro* cho thấy moxifloxacin không kìm hãm CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 hay CYP1A2 vì vậy thuốc có ít khả năng ảnh hưởng đến được động học của các thuốc chuyển hóa bởi cytochrom P450.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Có thể gặp phải viêm kết mạc, giảm thị lực, khô mắt, viêm giác mạc, khó chịu ở mắt, sưng tấy, đau mắt, ngứa mắt, xuất huyết dưới kết mạc và chảy nước mắt. Các phản ứng này xảy ra ở xấp xỉ 1 – 6% bệnh nhân.

Các tác dụng không mong muốn khác không diễn ra ở mắt đã được báo cáo ở tỷ lệ 1 – 4 % như sốt, ho, nhiễm khuẩn, viêm tai giữa, viêm hầu, mẩn đỏ và viêm mũi.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí

Khi dùng ngoài, chưa có trường hợp quá liều dung dịch nhỏ mắt chứa moxifloxacin nào được báo cáo. Thông tin về quá liều của thuốc còn hạn chế. Khi nhỏ mắt quá liều dung dịch Moxieye có thể rửa mắt ngay bằng nước ấm để loại bỏ thuốc

Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn.

Mã ATC: S01AE07

Cơ chế tác dụng

Cơ chế tác dụng của moxifloxacin (cũng như các kháng sinh fluoroquinolon khác) liên quan đến sự ức chế enzym tosoisomerase IV và ADN gyrase. Các enzym này cần cho sự tái tạo, sao chép, sửa chữa và kết hợp lại ADN của vi khuẩn. Ở các vi khuẩn Gram (-), các fluoroquinolon tác dụng chủ yếu vào ADN gyrase hơn là tosoisomerase IV, còn ở vi khuẩn Gram (+) thì ngược lại.

Moxifloxacin có tác dụng với hầu hết các chủng của các vi khuẩn sau cả *in vitro* và trong các nhiễm khuẩn trên lâm sàng:

Vi sinh vật Gram dương hiếu khí

Handwritten signature



*Corynebacterium species**

Microbacterium species

*Micrococcus luteus** (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại erythromycin, gentamicin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim).

Staphylococcus aureus (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại methicillin, erythromycin, gentamicin, ofloxacin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim)

Staphylococcus epidermidis (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại methicillin, erythromycin, gentamicin, ofloxacin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim)

Staphylococcus haemolyticus (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại methicillin, erythromycin, gentamicin, ofloxacin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim)

Staphylococcus hominis (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại methicillin, erythromycin, gentamicin, ofloxacin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim)

*Staphylococcus warneri** (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại erythromycin)

Streptococcus pneumoniae (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại penicillin, erythromycin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim)

Streptococcus viridans group (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại penicillin, erythromycin, tetracyclin và/hoặc trimethoprim)

Vi khuẩn Gram âm hiếu khí:

*Acinetobacter species**

Haemophilus alconae (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại ampicillin)

Haemophilus influenzae (bao gồm những chủng vi khuẩn kháng lại ampicillin)

*Haemophilus parainfluenzae**

Klebsiella pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

Các vi sinh vật khác:

Chlamydia trachomatis

* Hiệu quả trên vi sinh vật này được nghiên cứu ít hơn 10 sự nhiễm khuẩn

Đặc tính dược động học

Nồng độ huyết tương của moxifloxacin đã được đo ở những người trưởng thành, cả nam và nữ, nhờ mắt dung dịch moxifloxacin 0,5% 3 lần mỗi ngày. Giá trị nồng độ đỉnh C_{max} trung bình ở trạng thái cân bằng (2,7 ng/ml) và mức độ hấp thu hàng ngày dự tính AUC (45 ng.h/ml) thấp hơn 1600 và 1000 lần C_{max} và AUC thu được sau khi uống moxifloxacin với liều điều trị 400 mg. Thời gian bán thải huyết tương của moxifloxacin ước tính khoảng 13 giờ.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 ống 2 ml, Hộp 1 ống 5 ml, Hộp 1 ống 10 ml, Hộp 1 ống 3ml, Hộp 1 ống 8ml.

Hộp 1 vỉ x 5 ống 0,4ml, Hộp 2 vỉ x 5 ống 0,4ml, Hộp 4 vỉ x 5 ống 0,4ml, Hộp 10 vỉ x 5 ống 0,4ml.

Hộp 1 vỉ x 5 ống 1ml, Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml, Hộp 4 vỉ x 5 ống 1ml, Hộp 10 vỉ x 5 ống 1ml.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, 15 ngày sau khi mở nắp

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

U.

Handwritten signature

Handwritten signature

