





MẪU NHÃN NATRI CLORID 0.9%
CHAI 12 ml



Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vững



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thuốc nhỏ mắt, mũi

NATRI CLORID 0,9%

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần công thức thuốc:

Mỗi lọ dung dịch thuốc có chứa:

Thành phần được chất:	Lọ 5 ml	Lọ 6 ml	Lọ 8 ml	Lọ 10 ml	Lọ 12 ml
Natri clorid	45 mg	54 mg	72 mg	90 mg	108 mg

Thành phần tá dược: natri dihydrophosphat, dinatri hydrophosphat, kali sorbat (chất bảo quản), nước cất vừa đủ ...1 lọ.

Dạng bào chế:

Dung dịch trong suốt, không màu, dung trọng lọ nhựa, dây nắp kín.

Chỉ định:

- Nhỏ mắt hoặc rửa mắt, chống kích ứng mắt và sát trùng nhẹ.
- Trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi do dị ứng.
- Dùng thích hợp cho trẻ sơ sinh và người lớn.

Cách dùng, liều dùng:

Nhỏ hoặc rửa mắt, hắt mũi, mỗi lần 2 – 3 giọt, ngày 3 – 4 lần hoặc nhiều hơn.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân quá mẫn với natri clorid hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Trong thời gian sử dụng tránh làm nhiễm bẩn đầu lọ thuốc.
- Đây kín nắp lọ sau khi sử dụng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Thuốc an toàn cho người mang thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Thuốc không ảnh hưởng tới việc cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc không gây ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

* Tương tác của thuốc: Chưa có nghiên cứu

* Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Đôi khi có phản ứng dị ứng tại chỗ.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sự những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Natri clorid 0,9% khi dùng quá liều không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy không cần có biện pháp xử lý.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml; 6 ml; 8 ml; 10 ml; 12 ml, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh nắng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

Số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì chính của sản phẩm.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vinh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3822704 – 3823099

Nhà phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL PHARMACEUTICAL

6/7 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62965253

Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vàng

